

くすり
○ 薬のラベルをよむ



[用法・用量]



服用量 (服用回数)

年齢： 15歳以上(成人)・・・1回3錠(1日3回)
 11歳以上15歳未満・・・2錠(1日3回)
 5歳以上11歳未満・・・1錠(1日3回)
 5歳未満・・・・・・・・・・服用しないでください

※食後、なるべく30分以内に服用してください。
 決められた用法・用量をお守りください。

| ことば | いみ | | |
|------------------|----------------|----------------|--|
| ねんれい 年齢 | | しょくご 食後 | |
| さいいじょう 15歳以上 | 15歳・16歳・17歳・・・ | しょくぜん ※食前 | |
| さいみまん 15歳未満 | 14歳・13歳・12歳・・・ | しょっかん ※食間 | |
| ※15歳以下 | 15歳・14歳・13歳・・・ | くうふくじ ※空腹時 | |
| ふくようりょう 服用量 | | ぶんにない 30分以内 | |
| ふくようかいすう 服用回数 | | せいじん 成人 | |

○ 薬の しゅるい () にことばを いれましょう



の ぐすり を (の 飲みます)



ぬ ぐすり を ()
塗り薬




は ぐすり を ()
貼り薬



め ぐすり を ()
目薬

○ 下の薬の「^{くすり}効能・^{こうのう}効果」を A・B・Cから えらんで ^{せん}線を ひいて
ください。

①



^{かぜぐすり}
風邪薬



②



^{いたど}
痛み止め



③



^{いちょうやく}
胃腸薬



A. 飲み過ぎ・食べ過ぎ
胃もたれ・胃痛・胸やけ
食欲不振・消化不良
吐き気

B. 頭痛・歯痛・生理痛
関節痛・筋肉痛
腰痛・肩こり痛

C. 発熱・せき・たん
のどの痛み・悪寒
鼻みず・鼻づまり
くしゃみ・頭痛